




zampa di cane



# Le vaccinazioni

Una guida sintetica per le vaccinazioni del cane.

I vaccini obbligatori e facoltativi



## VACCINAZIONI

Le vaccinazioni da fare al proprio cane sono parecchie, alcune sono obbligatorie ed alcune facoltative e possono essere consigliate dal veterinario in casi specifici. Vediamo nel dettaglio le varie vaccinazioni da fare ai cani.

### Vaccinazioni obbligatorie e consigliabili

#### Cimurro

Serve a prevenire un virus, il Morbillivirus, molto aggressivo che può colpire il sistema nervoso, respiratorio e gastroenterico del cane.

Quando fare il vaccino per il Cimurro: viene effettuato nei cuccioli già svezzati e nei cani adulti che devono trascorrere molto tempo insieme ad altri animali.

#### Epatite infettiva

Questa malattia, causata dall'Adenovirus di tipo 1, ha un alto contagio tramite la saliva o le secrezioni di vario tipo come le urine o le feci. Si ha una maggiore concentrazione nel nord e nel centro dell'Europa e negli Stati Uniti. Colpisce principalmente i cuccioli che hanno tra i 3 ed i 12 mesi. Non esiste cura se non il trattamento preventivo.

Quando fare il vaccino contro l'epatite infettiva: nel cucciolo viene eseguito a circa 3 mesi di età

#### Leptosirosi

Questa malattia batterica determinata da due sierotipi (*L. icterohaemorrhagiae* e *L. canicola*) si diffonde sia dai cani malati che tramite l'ingestione di cibi infetti; anche l'uomo può essere infettato. Se il cane contrae questa malattia, difficilmente sopravvive e muore nell'arco di una settimana.



Quando fare il vaccino per la Leptospirosi: si effettua, nel cucciolo, dopo il compimento dei 2 mesi e va ripetuto dopo 21 giorni per almeno 3 volte. Nel caso si viva in campagna o in zone ricche di corsi di acqua, è consigliabile eseguire la vaccinazione ogni 6 mesi.

### **Parvovirosi**

Serve a prevenire la gastroenterite emorragica ed è una malattia ad alto contagio, visibile soprattutto nelle cucciolate numerose.

Quando fare il vaccino per la Parovirosi: si effettua quando i cuccioli hanno circa 8 settimane di vita e anche nel cane adulto se necessario

### **Tracheobronchite o tosse canina**

E' una malattia che colpisce le vie respiratorie. Non è una malattia mortale e il vaccino è una scelta soggettiva; spesso il vaccino ha un'efficacia variabile a seconda del cane a cui viene somministrato. Il vaccino viene somministrato al cane sotto forma di gocce nasali.

Quando fare il vaccino per la tosse canina: generalmente è sufficiente fare il vaccino pentavalente.

## **Vaccinazioni da fare in particolari circostanze**

### **Babesia**

Si tratta di un agente che causa l'anemia acuta nel cane. Il vaccino spento non protegge da questo agente ma è semplicemente un aiuto alla patologia.

Quando fare il vaccino contro la Babesia: solo nel caso si presenti la patologia

### **Bordetella Bronchiseptica**

Fa parte degli agenti che scatenano la tosse dei canili. Il vaccino ha una durata di soli 12 mesi e non è obbligatorio. E' consigliabile là dove ci siano particolari condizioni di sovraffollamento canino.

Quando fare il vaccino per la Bordetella: il cucciolo va vaccinato dopo aver compiuto 2 mesi e va ripetuto ogni anno.



## **Borrelia Burgdorferi**

Questo agente porta ad una malattia che viene trasmessa dalle zecche, la malattia di Lyme. Non è un vaccino obbligatorio ma è consigliabile nel caso si tratti di una malattia endemica.

Quando fare il vaccino per la Borrelia: viene eseguito al cane che abbia almeno 2 mesi di vita e va ripetuto dopo 21 giorni. I richiami sono poi annuali

## **Coronavirus**

Questo tipo di virus scatena eventi di gastroenteriti soprattutto nei cuccioli di cani; non è particolarmente contagioso. Il vaccino non è obbligatorio e se ne consiglia l'utilizzo solo in ambienti molto affollati dai cani

Quando fare il vaccino contro il Coronavirus: si fa solo ai cani che vivono in ambienti insalubri

## **Gianda Lambia**

E' un agente che causa gastroenteriti e il vaccino è di tipo spento. Il suo uso è limitato alla riduzione dei sintomi ma non debella la malattia.

Quando fare il vaccino contro la Gianda Lambia: in seguito alla manifestazione delle patologie.

## **Herpesvirus**

Questo virus porta all'aborto o alla nascita di feti morti. E' consigliabile negli allevamenti e nelle cagne che hanno presentato situazioni di infezioni durante il parto. E' un vaccino nuovo ed il costo elevato ne rende difficile l'uso.

Quando fare il vaccino per l'Herpesvirus: il vaccino viene somministrato solo prima del parto

## **Parainfluenza**

E' un agente che contribuisce alla tosse canina ed è un vaccino che viene eseguito a parte rispetto alle vaccinazioni tipiche.

Quando fare il vaccino per la parainfluenza: si può eseguire questo vaccino insieme al vaccino per il cimurro ed il vaccino della parvovirosi. Si deve sottoporre il cane ad un richiamo dopo 60 giorni e dopo 90 giorni dalla prima somministrazione. Il richiamo sono poi annuali.



## **Rabbia**

Questo vaccino è obbligatorio per i cani che hanno più di 3 mesi di età e che escono dall'Italia; va fatto prima della partenza con almeno 20 giorni di anticipo. La rabbia può colpire anche l'uomo.

Quando fare il vaccino per la rabbia: solo se necessario dopo i 3 mesi di età del cucciolo e i richiami vanno eseguiti a distanza di 1 o 3 anni, in base alla necessità individuale.

## **Il protocollo delle vaccinazioni obbligatorie nel di cane**

- intorno ai 2 mesi di età viene effettuata la vaccinazione della parvovirosi, il vaccino per il cimurro e se necessario, quello della Parainfluenza
- dopo 21 giorni da questo primo vaccino va eseguito un vaccino pentavalente che comprende il vaccino per l'epatite infettiva, la parvovirosi, il cimurro, la leptospirosi e la parainfluenza)
- dopo altri 21 giorni va rifatto il vaccino pentavalente sopradescritto
- intorno ai 4 mesi di età si può fare, se necessario, il vaccino contro la rabbia
- ogni anno va eseguito il richiamo del vaccino pentavalente
- ogni 3 anni si fa il richiamo per la parvovirosi, il cimurro, la parainfluenza e l'epatite infettiva

## **Quando fare le vaccinazioni se il cane è adulto**

- il primo ciclo di vaccini da fare sono per la Parvovirosi, il cimurro, l'epatite infettiva, la Leptospirosi e la parainfluenza se ritenuto necessario dal veterinario
- dopo 3 settimane il cane subirà il richiamo del vaccino per la Parvovirosi, il cimurro, l'epatite infettiva, la Leptospirosi e la parainfluenza più rabbia se ritenuto necessario
- ogni anno il cane deve fare il vaccino di richiamo per la Leptospirosi e se ha effettuato il vaccino contro la rabbia
- ogni tre anni il cane dovrà rifare il vaccino per Parvovirosi, il cimurro, l'epatite infettiva, la Leptospirosi e la parainfluenza più rabbia se ritenuto necessario